



Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának jelentése alapján 2010. 08. héttől a hosszú tél és hideg után robbanásszerűen elindult a 2010. év pollenszezonja. □

A 7. héten még csak néhány városban regisztrálták a mogyoró , a ciprus- és tiszafafélék, valamint az éger virágporaszemeit, de leginkább még csak alacsony koncentrációban és csak a hét végén 1-2 napon. A 8. hét végén azonban a napsütés és meleg hatására egyszerre több növény pollenszórása is elindult.

A legtöbb állomáson a mogyoró (Corylus) virágporaszemei voltak jelen legnagyobb mennyiségben a csapdáknak, napi koncentráció értéke azonban még nem érte el sehol sem a nagyon magas szintet - 7 városban magas, 7-ben közepes, Szolnokon alacsony szintet mértek. Az éger (Alnus) összpollenszáma kissé alacsonyabb volt, azonban Mosdóson és Zalaegerszegen a hét utolsó napján meghaladta a nagyon magas határértéket is. A legtöbb állomáson még közepes, Veszprémben, Győrött és Békéscsabán magas koncentrációban regisztrálták. A ciprus- és tiszafafélék (Cupressaceae/Taxaceae) pollenkoncentrációja általában alacsony szintet ért el - a hét vége felé 6 városban egy-egy napon meghaladta a közepes határértéket. A hét második felében elindult a nyír (Betula), a juhar (Acer), a szil (Ulmus) és a kőris (Fraxinus) virágporaszórása is - azonban csak a juhar pollenjéből és csak egy napon, Békéscsabán detektáltak közepes szintet éppen meghaladó értéket.

Az allergén gombaelemek koncentrációja alacsony - közepes szintet csak 6 állomáson detektáltak egy-két napon.

Dr. Lehel Ferenc

kistérségi tisztifőorvos