



A 10. héten a hideg és a havazás miatt országszerte erősen leesett a pollenterhelés, csak a hét utolsó napjaiban emelkedett ismét.

□

Miskolc kivételével mindenütt az éger (*Alnus*) virágpóra van jelen legnagyobb mennyiségben a csapdákban - a legmagasabb terhelés Pécsen és Mosdóson volt, de a nagyon magas szintet itt is csak a hét utolsó napján érte el, ekkor még néhány állomáson regisztráltak magas szintet, ettől eltekintve azonban közepes, illetve alacsony koncentrációt mértek. A mogoró (*Corylus*) pollenkoncentrációja magas szintet a héten egy állomáson sem ért el, közepes szintet is csak 8 városban és csak a hét második felében mértek.

A ciprus- és tiszafafélék (*Cupressaceae/Taxaceae*) és a juhar (*Acer*) pollenjének mennyisége egy-egy városban és legfeljebb egy-két napra érte el a közepes szintet, a szil (*Ulmus*) pollenjéből Veszprémben regisztráltak közepes szintet a hét utolsó napján. Néhány állomáson alacsony koncentrációban monitorozták a csapdákban a nyír (*Betula*), a fenyőfélék (*Pinaceae*) és a kőris (*Fraxinus*) pollenszemeit is.

Az allergén gombaelemek koncentrációja is lecsökkent a héten - közepes szintet csak Debrecenben, Győrött és Zalaegerszegen ért el.

Dr. Lehel Ferenc

kistérségi tisztifőorvos